

RESUMO

BERTERO, E.B. **Avaliação da função sexual em pacientes submetidos à vasectomia utilizando-se o índice internacional de função erétil.** São Paulo, 2003. 70p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Introdução: A vasectomia é um método contraceptivo masculino permanente muito realizada atualmente. É uma cirurgia de baixo custo, rápida, ambulatorial e com baixos índices de falhas e complicações. Existe uma escassez de trabalhos na literatura que lidam com aspectos psicológicos ou sexuais relacionadas à cirurgia. **Objetivos:** Comparar, prospectivamente, a função sexual de homens antes e após a cirurgia de vasectomia utilizando o Índice Internacional de Função Erétil (IIEF), **Casuística e Métodos:** Foram incluídos 64 pacientes, no período de outubro a dezembro de 2002, candidatos a esterilização masculina dentro do programa de vasectomia da Disciplina de Urologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. O IIEF foi aplicado pelo mesmo investigador antes e depois de 90 dias da cirurgia. A média da pontuação obtida nas visitas pré e pós-operatória de todos os domínios da função sexual foram analisadas e comparadas pela prova de Wilcoxon. **Resultados:** A idade média dos pacientes foi de 35 anos variando de 25 a 48 anos e a média de filhos por homem foi de 3. O escore médio total do IIEF antes da cirurgia foi de 64,06 e depois de 65,64 sendo esta diferença considerada estatisticamente significativa ($p < 0,001$); sessenta e sete por cento dos pacientes melhoraram a sua pontuação, contra 17% e 16% que pioraram e não alteraram a soma do IIEF após a cirurgia, respectivamente. Dos cinco domínios da função sexual, desejo e satisfação sexual foram os que apresentaram melhora estatisticamente significativa. **Conclusão:** Este estudo demonstrou que a vasectomia causou um impacto positivo na função sexual, principalmente desejo e satisfação sexual, na maioria dos homens submetidos à cirurgia.